



ที่ บร ๐๐๐๘.๑๗/ว๒๓

ที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ
ถนนหัวถนน-ดอนอะราง บร ๓๑๑๑๐

เทศบาลตำบลโกรกแก้ว
เลขรับที่ ๘๒๑ ๒๔
วันที่ 10 มิ.ย. 2568
เดือน พ.ศ.
เวลา ๐๙.๓๗ น.

๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง เชื่อมงวดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคแอนแทรกซ์ในพื้นที่เสี่ยง

เรียน นายกเทศมนตรีทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

ตามที่ตรวจพบรายงานผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยยืนยันโรคแอนแทรกซ์ที่อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยผู้ป่วยมีประวัติชำแหละและรับประทานเนื้อโคดิบ ซึ่งจากการเฝ้าระวังทางอาการและเก็บตัวอย่างเลือดโค กระบือในพื้นที่เสี่ยงส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นั้น

เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการเกิดโรคและให้การควบคุมโรคดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดบุรีรัมย์จึงให้ท่านเชื่อมงวดมาตรการเฝ้าระวัง ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์เตือนภัยเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ สหกรณ์โคนมและศูนย์รับนมในพื้นที่เกี่ยวกับสถานการณ์โรคแอนแทรกซ์ในประเทศและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยเน้นให้เกษตรกรเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังโรค หากพบสัตว์ป่วยตายเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ (per acute) หรือแสดงอาการสงสัยตามนิยามของโรคแอนแทรกซ์ คือ โค กระบือ แพะ แกะที่มีการตายเฉียบพลัน เลือดไหลออกจากปาก จมูก ทวารหนัก โดยเลือดมีลักษณะไม่แข็งตัวให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันทีเพื่อควบคุมโรค และห้ามเปิดผ่าซาก ห้ามเคลื่อนย้ายซากหรือชำแหละเพื่อการบริโภคโดยเด็ดขาด

๒. มาตรการควบคุมโรคแอนแทรกซ์หากพบโรคมีการระบาดในพื้นที่

๒.๑ การบริหารจัดการ

- จัดให้มีการบริหารจัดการควบคุมโรคผ่านศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุโรคของอำเภอ

- บันทึกล้างกักสัตว์เพื่อห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วย สัตว์ร่วมฝูงและสัตว์ในรัศมี ๕ กิโลเมตรจากจุดเกิดโรคและห้ามมิให้ผู้ใดทำการเคลื่อนย้าย ซ้ำแหละ หรือกระทำการเปิดซากสัตว์ที่ตายโดยเด็ดขาด

- ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในรัศมีไม่เกิน ๕ กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค เพื่อควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ในพื้นที่

๒.๒ กักฝูงสัตว์ในพื้นที่ที่ตรวจพบโรค หรือฝูงสัตว์ที่พบสัตว์ป่วยตายเฉียบพลัน หรือกระทันหัน หรือฝูงสัตว์บริเวณที่ตรวจพบเชื้อแอนแทรกซ์ หรือบริเวณที่มีการชำแหละซาก หรือฝูงที่มีความเสี่ยงที่มีการสัมผัสกับฝูงที่เกิดโรค เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน สังเกตอาการสัตว์ภายในฝูง ร่วมกับฉีดยาปฏิชีวนะกลุ่มเพนิซิลลิน อย่างน้อยเป็นเวลา ๗ วัน

๒.๓ ประสานกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ เพื่อจัดตั้งจุดตรวจควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ไม่ให้นำสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงออกนอกพื้นที่

๒.๔ ขอความร่วมมือตลาดนัดค้าสัตว์ในพื้นที่อำเภอที่มีโรคระบาดและอำเภอที่มีความเสี่ยงหรือมีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดที่มีโรคระบาดปิดทำการตลาดนัดค้าสัตว์ เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค

/๒.๕ งดนำสัตว์...

๒.๕ งดนำสัตว์ไปเลี้ยงในพื้นที่แปลงหญ้า หรือแหล่งน้ำในบริเวณที่มีความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อ

๒.๖ สอบสวนหาสาเหตุและการแพร่กระจายโรค โดยดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อค้นหาผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการระบาดในฝูงใหม่

๒.๗ ค้นหาสัตว์ป่วย รวมถึงเฝ้าระวังโรคในพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำ ดิน ในพื้นที่เสี่ยง และเก็บตัวอย่างโค กระบือในพื้นที่เสี่ยงส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

๒.๘ ทำลายเชื้อโรคแอนแทรกซ์ด้วยโซดาไฟ (โซดาไฟ ๑ กิโลกรัม ต่อน้ำ ๑๐ ลิตร) โดยฉีดพ่นหรือราดให้ชุ่มผิวดิน และให้ยาฆ่าเชื้อซึมลงไปในผิวดินอย่างน้อย ๑๕ เซนติเมตร ในฟาร์มที่พบโรคหรือพบสัตว์ป่วยตายเฉียบพลันหรือกระทันหัน หรือบริเวณที่ตรวจพบเชื้อแอนแทรกซ์ หรือบริเวณที่มีการชำแหละซาก ทั้งนี้ ยาฆ่าเชื้อที่แนะนำ คือ ๑๐% ฟอร์มาลิน หรือโซดาไฟ หรือ ๐.๕ % โซเดียมไฮโปคลอไรต์

๒.๙ การรายงานโรค ให้รายงานสถานการณ์โรคและผลการดำเนินการควบคุมโรคให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและเตรียมความพร้อมเผชิญโรค ปศุสัตว์จังหวัดทุกวันจนกว่าโรคสงบและรายงานในระบบ e smart surveillance ตามระบบ กคร. ๑ - ๕

๒.๑๐ การป้องกันตนเองของผู้ปฏิบัติงาน ให้แต่งกายให้รัดกุมด้วยชุด PPE เช่นเดียวกับกรณีการควบคุมโรคใช้หวัดนกหรือโรคติดต่อร้ายแรงอื่นๆ โดยพิจารณาตามสถานการณ์ สำหรับการฉีดวัคซีนให้ใส่ถุงมือ หน้ากากอนามัย รองเท้าบูท ทุกครั้ง

๒.๑๑ การทำลายซากสัตว์ที่เป็นโรคแอนแทรกซ์ ควรดำเนินการ ณ สถานที่สัตว์ตายโดยการเผาซากสัตว์หรือฝังซากสัตว์ทั้งตัวให้ส่วนบนสุดของซากอยู่ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และพูนดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า ๐.๕ เมตร แล้วโรยยาฆ่าเชื้อทับและใช้ยาฆ่าเชื้อที่ทำลายเชื้อโรคระหว่างดำเนินการทุกขั้นตอน ทั้งนี้ สถานที่ขุดหลุมฝังให้พิจารณาบริเวณไม่มีน้ำท่วมและควรห่างจากแหล่งน้ำแหล่งอาหารและแปลงหญ้า โดยระหว่างดำเนินการทุกขั้นตอนเจ้าหน้าที่ต้องแต่งกายใส่ชุดป้องกันตนเองให้รัดกุม

๒.๑๒ ฉีดวัคซีนโรคแอนแทรกซ์ให้กับสัตว์โน้รศมี ๕ กิโลเมตร รอบพื้นที่ตรวจพบโรคหรือฝูงสัตว์ที่พบสัตว์ป่วยตายเฉียบพลันหรือกระทันหัน หรือฝูงสัตว์บริเวณที่ตรวจพบเชื้อแอนแทรกซ์ หรือบริเวณที่มีการชำแหละซาก หรือฝูงที่มีความเสี่ยงที่มีการสัมผัสกับฝูงที่เกิดโรค โดยฉีดวัคซีนจากรศมี ๕ กิโลเมตรเข้าหาจุดเกิดโรคและห้ามใช้วัคซีน ๑ ขวดในการฉีดสัตว์มากกว่า ๑ ฝูง รวมทั้งอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนในสัตว์หลายฝูงและเข้มงวดเรื่องระบบความปลอดภัยชีวภาพ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนุฑตาภา หอมหวล)

นายอำเภอโนนสุวรรณ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

โทร. ๐ ๘๙๑๗ ๘๘๔๘๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ampn1111@dd.go.th